



Nota de prensa

Sevilla, 18 de octubre de 2025

FOAM exige la vacunación VRS para mayores tras el repunte de infecciones respiratorias en Andalucía y en España

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) solicita a la Junta de Andalucía la inclusión urgente de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en la campaña 2026-2027 para mayores, tras el análisis de la evolución de infecciones respiratorias agudas basado en los informes oficiales más recientes de Andalucía y de España.

Las cifras oficiales autonómicas muestran que la tasa de IRA en atención primaria en Andalucía fue de 232,0 casos por 100.000 habitantes en la semana 40 y 239,7 en la semana 41, frente a 483,1 y 480,3 en España. La incidencia proxy de gripe en Andalucía subió de 7,4 a 30,9 (en España estable en torno a 20), y la de COVID-19 en Andalucía se mantuvo alrededor de 15,1-15,6, muy por debajo de la media nacional (63,8-50,4). La presión hospitalaria (IRAG) se mantiene más baja en Andalucía (4,9-5,9), frente a 9,7-10 en el resto de España.

Tabla comparativa: Incidencia semanal (casos por 100.000 habitantes)


Territorio	Semana	IRA Atención Primaria	Gripe (proxy)	COVID-19 (proxy)	Hospitalización IRAG
Andalucía	40	232,0	7,4	15,1	4,9
	41	239,7	30,9	15,6	5,9
España	40	483,1	20,3	63,8	9,7
	41	480,3	20,2	50,4	10

Incidencia por 100.000 habitantes

Fuente: Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) y Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía (SVEA)

Evolución gráfica Andalucía vs España (semanas 40-41):

Incendencia semanal (por 100.000 hab.) en Andalucía y España Semana 40 (29 de septiembre - 5 de octubre) | Semana 41 (6 - 12 de octubre) IRA AP, gripe, COVID-19, IRAG



Incidencia por 100.000 habitantes

Fuente: Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) y Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía (SVEA)

El análisis comparativo evidencia claramente que Andalucía mantiene incidencias mucho menores que la media nacional en todos los indicadores principales, aunque sí se observa un brusco repunte de la gripe en la última semana. Tanto la presión en atención primaria como la hospitalización IRAG son actualmente más bajas en Andalucía. Sin embargo, las tendencias nacionales anticipan un aumento estacional y justifican aún más la necesidad de prevención en mayores.

Aunque el VRS es conocido principalmente por causar bronquiolitis en bebés, este virus provoca cada año miles de hospitalizaciones y una elevada mortalidad en personas mayores, con mayor gravedad incluso que la gripe en este grupo de edad. La letalidad por VRS en mayores de 80 años se sitúa por encima del 9% de los ingresos hospitalarios, según estudios recientes.

La época de mayor circulación del VRS en España y Europa se sitúa entre diciembre y enero. Por los plazos técnicos y administrativos que implica preparar una nueva estrategia vacunal (entre 8 y 12 meses), instamos a la Junta a aprobar y planificar ya la campaña en mayores de cara a la temporada 2026-2027, asegurando igualdad real de acceso y protección en la comunidad respecto al resto del país y de Europa.

Reiteramos nuestro llamamiento para que la administración sanitaria andaluza asuma anticipe las medidas preventivas eficaces para sus mayores y población más vulnerable en la próxima temporada de virus respiratorios.

Más información:

FOAM – Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores

954 29 30 48

foam@foam.es

<https://foam.es>